


RLS'de ekstralarenjeal terminal bifürkasyon (ETB)

- ETB, RLS servikal seyrinde, ayrı noktalardan larenkse giren, çapları boyutları yakın iki terminal dala ayrılmasıdır.
- **RLS'de ETB siktir. RLS lerin %27-31'inde bulundu.**
- ETB bilateral olabilir. ETB'li olguların %25-28'inde bilateral saptandı.
- Bifürkasyon noktası farklı segmentlerde yer alabilir.

Arter öncesi %11.1	Arter %46.3	Arter sonrası %42.6
%15	%37.5	%32.5
- Bilateral olgularda %25 aynı, %75 farklı segmentte olabilir.
- İONM sonucu; Ön dal %100 motordur. Arka dal %12 (%1.5-15) motor aktivite göstermektedir. Bu aktivite ön dala göre daha zayıftır (%14-78).


RLS servikal segmenti



Sağ **RLS servikal segmenti: Tiroit lobu öne doğru kaldırıldığında ortaya konan sinir görüntüsü.**


Postoperatif vokal kord paralizisi.

RLS, Ektralarenjeal Terminal Bifürkasyon (ETB)



Anatomik varyasyon: ETB, sağ RLS.

RLS ve ETB



Anatomik varyasyon: ETB, sağ RLS.

RLS yaralanma mekanizmaları

A. Traksiyon.

A1. Berry ligamanı.

A2. Guatr kitlesi.

B. Mekanik Bası.

B1. Sert cisim ile bası.

B2. Klempleme.

C. Bağlama.

D. Termal hasar.

E. Transeksiyon.